

INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS – MENINGITE BACTERIANA

DENOMINAÇÃO	Taxa de incidência de meningite bacteriana
INDICADOR	Taxa de incidência de meningite bacteriana
MÉTODO DE CÁLCULO	<p>Numerador:</p> <p>Nº de casos confirmados de meningite bacteriana em um determinado ano e local de residência</p> <p>Denominador:</p> <p>População residente nesse mesmo local e ano</p> <p>Fator de multiplicação: 100000</p>
UNIDADE GEOGRÁFICA	Nacional, Estadual e Municípios
FONTE DE DADOS	SINAN
INTERVALO DE DISPONIBILIDADE DOS DADOS	Semestral
USOS	<p>Analisar variações geográficas e temporais na incidência da meningite bacteriana, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica para prevenção e controle da doença. Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para o controle da doença</p>
LIMITAÇÕES	<p>Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e confirmar casos por meningite bacteriana</p>
OBSERVAÇÕES GERAIS	-
ÁREA RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	DEVIT/SVS/MS

DENOMINAÇÃO	Taxa de letalidade por meningite bacteriana
INDICADOR	Taxa de letalidade por meningite bacteriana
MÉTODO DE CÁLCULO	<p>Numerador:</p> <p>Número de óbitos por meningite bacteriana em um determinado ano e local de residência</p> <p>Denominador:</p> <p>Total de casos</p> <p>Fator de multiplicação: 100</p>
UNIDADE GEOGRÁFICA	Nacional, Estadual e Municípios
FONTE DE DADOS	SINAN
INTERVALO DE DISPONIBILIDADE DOS DADOS	Semestral
USOS	O cálculo da letalidade fornece a gravidade da meningite bacteriana, pois indica o percentual de pessoas que morreram pela doença, além de informar sobre a qualidade da assistência médica oferecida à população
LIMITAÇÕES	Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica. Depende de informações do atestado de óbito que nem sempre condizem com a causa real da morte
OBSERVAÇÕES GERAIS	-
ÁREA RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	DEVIT/SVS/MS

INDICADORES OPERACIONAIS – MENINGITE BACTERIANA

DENOMINAÇÃO	Percentual de casos de meningite bacteriana encerrados por diagnóstico laboratorial específico
INDICADOR	Percentual de casos encerrados por diagnóstico laboratorial específico
MÉTODO DE CÁLCULO	<p>Numerador:</p> <p>Número de casos confirmados de meningite bacteriana, encerrados pelo critério laboratorial específico (cultura, CIE, Látex e PCR) em um determinado ano e local de residência</p> <p>Denominador:</p> <p>Total de casos confirmados de meningite bacteriana</p> <p>Fator de multiplicação: 100</p>
UNIDADE GEOGRÁFICA	Nacional, Estadual e Municípios
FONTE DE DADOS	SINAN
INTERVALO DE DISPONIBILIDADE DOS DADOS	Semestral
USOS	É de grande importância na vigilância das meningites, pois identifica aqueles locais (cidades ou estados) com menor ou maior proporção de casos de meningite identificados por critério laboratorial específico
LIMITAÇÕES	Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica
OBSERVAÇÕES GERAIS	-
ÁREA RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	DEVIT/SVS/MS

DENOMINAÇÃO	Percentual de casos de meningite bacteriana que realizaram quimioprofilaxia oportuna
INDICADOR	Percentual de casos que realizaram quimioprofilaxia oportuna
MÉTODO DE CÁLCULO	<p>Numerador:</p> <p>Total de casos de Doença Meningocócica que tiveram a data da quimioprofilaxia realizada no período menor ou igual a dois dias da data da notificação</p> <p>Denominador:</p> <p>Total de número de casos de Doença Meningocócica</p> <p>Fator de multiplicação: 100</p>
UNIDADE GEOGRÁFICA	Nacional, Estadual e Municípios
FONTE DE DADOS	SINAN
INTERVALO DE DISPONIBILIDADE DOS DADOS	Semestral
USOS	A quimioprofilaxia constitui a principal medida de controle e prevenção nos casos de Doença Meningocócica. Portanto, quando ocorrem casos desta doença existe grande risco dos contatos próximos dos casos adoecerem, sendo recomendada a instituição da quimioprofilaxia
LIMITAÇÕES	Número de casos de Doença Meningocócica com a informação da data da quimioprofilaxia como ignorada ou em branco; Divergências entre a data da quimioprofilaxia que está registrado do SINAN de como é realizada de fato (aparecimento de casos secundários)
OBSERVAÇÕES GERAIS	-
ÁREA RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	DEVIT/SVS/MS